











# Solu-Cortef® injektion vid akut binjurebarkssvikt



Här beskrivs steg för steg vad du ska göra om du misstänker akut binjurebarkssvikt, Addisonkris, och hur du förbereder och ger Solu-Cortef® injektionen.

För ytterligare information besök <https://adrenals.eu/video>, där kan du se en animerad film med instruktion hur du ger Solu-Cortef®.

**SVENSKA  
ADDISONFÖRENINGEN**  
Hjälp oss hjälpa dig och andra

 <p><b>1</b></p>	<p>Ta fram akutväskan för Solu-Cortef® injektion. Du behöver en flaska Solu-Cortef® 100mg, en spruta och 2 olika kanyler. Du ska ge injektionen även om du inte är helt säker på att det är en akut binjurebarkssvikt. Det kan aldrig skada.</p>  <p><b>2</b></p>
 <p><b>3</b></p>	<p>Tryck hårt på toppen av flaskan så att vätskan blandar sig med pulvret.</p>  <p><b>4</b></p>
 <p><b>5</b></p>	<p>Undvik att skaka flaskan.</p>  <p><b>6</b></p>
 <p><b>7</b></p>	<p>När vätskan är klar och genomskinlig, sätt den grova uppdragningskanylen på sprutan.</p>  <p><b>8</b></p>
 <p><b>9</b></p>	<p>Byt till den tunnare injektionskanylen.</p>  <p><b>10</b></p>
 <p>Kontrollera att det inte finns någon luft i sprutan genom att rikta kanylen uppåt och knacka på sprutan. Spruta försiktigt ut en droppe vätska från nålen.</p>	 <p>Stick in kanylen i muskeln på utsidan av låret. Injicera medicinen. Kläder behöver inte nödvändigtvis tas av.</p>

Effekten av Solu-Cortef® kommer inom en halvtimme men du ska **ALLTID uppsöka sjukvård eller ringa 112 i samband med akut binjurebarkssvikt.**