

# အရေးကြီးသော ကျန်းမာရေး သတိပြုရန်အချက်



ဤလူနာသည် လူတစ်ဦးနေ့စဉ် ပျမ်းမျှလိုအပ်သော  
ကော်တီဇိုင်းဆေးပမာဏကို ကြာရှည်စွာသောက်သုံးနေရပါသည်။  
ရောဂါဖိစီးမှုများသောအချိန် - ပြင်းထန်စွာနာကျန်းဖြစ်ခြင်း၊  
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝမ်းလျှော့ခြင်းအခြေအနေတွင်

## Hydrocortisone

- အသက် : ၁ နှစ်အောက် : 25 mg
- အသက် : ၁ နှစ်မှ ၆ နှစ် : 50 mg
- အသက် : ၆ နှစ်အထက် : 100 mg

ကို သွေးကြောဆေးသွင်းခြင်း / အသားဆေးထိုးခြင်း နှင့်

0.9% Saline ဆေးသွင်းခြင်းကို

နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

---

အမည်

---

လူနာအမှတ်စဉ်နံပါတ်။ မွေးသက္ကရာဇ်

**မြန်မာနိုင်ငံတော်မှန်းရောဂါအထူးကုဆေးပညာအဖွဲ့**